

Control químico del gorgojo de los Andes

Reconocimiento del problema

El gorgojo es una plaga conocida como gusanera de la papa o "papakuru", que arruina a la papa. En casos extremos puede destruir toda una chacra. En el mercado bajan el precio de toda la carga si encuentran algunas papas con gusanos.

Información general

Los gusanos salen de huevos que ponen los gorgojos en los cuellos de las plantas pequeñas.

Los gorgojos adultos comen los bordes de las hojas de la papa. Dejan mordeduras en forma de media luna.


Manejo

Si ve mordeduras en las hojas de la papa, o si sabe que va a tener problemas con gorgojos, puede fumigar con insecticida al cuello de la planta pequeña, para matar a los huevos del gorgojo y a los gusanos pequeños. Fumigue cuando casi todas las plantas hayan nacido, antes que los gorgojos pongan sus huevos. Puede aplicar Triflumuron (Alsystin 25 WP, Inhibidor de quitina).

Mezcle 20 cc por una bomba de 20 litros de agua, o siga las instrucciones en la etiqueta. Si el ataque es fuerte puede volver a aplicar insecticidas en 12 a 15 días.

Los insecticidas son venenos. Cuando trabajamos con insecticidas se debe tener cuidado y usar equipos de protección, como guantes, máscaras, botas, y barbijo. La mochila de fumigar debe estar en buenas condiciones.

El gusano blanco se encuentra dentro de la papa. (Foto por Zofía Estela)



El gorgojo adulto comiendo hojas de noche, dejando mordeduras en forma de media luna. (Foto por Zofía Estela Livia)



Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección y siga las instrucciones que están en la etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la cosecha.

Nombre científico > *Premnotrypes spp.*

Las recomendaciones en esta hoja volante son relevantes a: Perú