

CUIDADOS DEL PARTO EN VACUNOS



ATENCIÓN DE LA VACA ANTES DEL PARTO


- Llevar un registro de fecha de empadre o de inseminación para la vigilancia de los días previos al parto.
- Suministrar suficiente alimento y sales minerales, ya que durante los dos últimos meses el feto crece del 70% al 75% del total.
- Cuando la vaca está inquieta hay que separarla del resto de vacas a un lugar seco, limpio y ventilado.

SIGNOS INDICADORES DEL MOMENTO DEL PARTO

- Abultamiento de la ubre.
- Pezones erectos y las puntas llenas.
- Goteo de leche.
- Cierta hundimiento a ambos lados del maslo de la cola.
- Intranquilidad del animal.

ATENCIÓN DE LA VACA DURANTE EL PARTO

- En el momento del parto primero aparece la bolsa de agua; luego las patas delanteras del ternero, después las rodillas y finalmente la cabeza.
- Si se observa una posición anormal del ternero debe intentarse colocarlo en posición correcta con un mínimo de manipulación y cuidando de no rasgar el útero.



- Cuando la vaca deja de pujar hay que ayudarla, lentamente jalar al ternero cada vez que la vaca puja; con las manos limpias y uñas recortadas se verifica la posición del ternero, jalando hacia arriba, hasta que salga la cabeza.
- El ternero debe venir con las patas delanteras o traseras unidas.



- Después de verificar la posición que trae la cría, si es incorrecta regresarla al interior del útero y tratar de corregir su posición.
- Es aconsejable que el parto lo atienda un profesional con experiencia suficiente.



ATENCIÓN DE LA VACA DESPUÉS DEL PARTO

- Verificar que la placenta caiga completamente para enterrarla, impidiendo que la vaca se la coma.
- El trabajo de parto ejerce una tensión en la vaca, por ello en esos momentos está más propensa a las infecciones.
- Después de eliminar la placenta es recomendable colocar un óvulo a la vaca para contrarrestar cualquier infección.

ATENCIÓN DEL TERNERO RECIÉN NACIDO

- Limpiar la nariz del ternero al nacer utilizando un trapo limpio.
- Verificar que no haya tragado líquido.
- Meter los dedos en la boca al ternero para quitar los mocos que puedan ahogarlo.
- Frotar todo su cuerpo con un trapo limpio.
- Cortar el ombligo a 2 pulgadas del cuerpo y desinfectarlo con yodo.

- Dejar que la vaca lama el cuerpo del ternero para ayudarlo a respirar.



- Asegurar que empiece a caminar y mame el calostro.



- Anotar la fecha de nacimiento, sexo y nombre, en el registro.



Estación Experimental Agraria Santa Ana - Huancayo

Fundo Santa Ana Hualahoyo km 8,0 El Tambo - Huancayo

Telefax: 064-246206 Teléfono: 064 - 247011

E-mail: santaana@inia.gob.pe santaana_uea@inia.gob.pe citsantaana@inia.gob.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2014 - 16111

Impreso en el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA
Av. La Molina N° 1981, La Molina Lima 12 - Casilla N° 2791 - Lima 1
Telefax: 349-5631 / 349-2600 Anexo 248 <http://www.inia.gob.pe>

