

## EMPADRE EN OVINOS



El empadre en ovinos consiste en aparear machos (carnerillos y carneros) con hembras (borreguillas y borregas) con el fin de obtener crías, después de 5 meses de gestación.

Es una actividad muy importante de la cual depende mayormente el resto de las faenas ovejeras.

### ÉPOCA DE EMPADRE

- La época de empadre en condiciones del pequeño productor, que tiene ovinos criollos y cruzados, se realiza durante todo el año. Las borregas presentan celo continuo y las pariciones ocurren durante todo el año, con alta mortalidad en crías llegando hasta el 70%.



razas cruzadas y puras, las borregas presentan celo estacionario, realizándose el empadre en los meses de diciembre - enero y mayo - junio, con lo cual obtiene un 70% a 80% de crías logradas.

- Los meses de mayor presencia de celo son de enero a julio.
- Teniendo en cuenta la época de inicio de lluvias para la producción de pastos, así como la incidencia de heladas, la época ideal de empadre son los meses de mayo-junio o junio-julio.



- En caso del mediano y el gran productor que tienen grandes terrenos y manejan mayor número de ovinos de

### MÉTODOS DE EMPADRE

#### 1. Empadre continuo

Es un sistema donde los machos con las hembras permanecen juntos desde el inicio hasta el final del empadre; se usa el 5% de machos.

El pastor hace el movimiento de los animales al mediodía con el fin de que los machos encuentren hembras en celo.

#### 2. Empadre alternado

Se utiliza el 5% de machos en 2 grupos.

En la primera semana entra al empadre el primer grupo, pasando a descansar la siguiente semana siendo reemplazados por los machos del segundo grupo y éstos pasan a descansar la siguiente semana así sucesivamente hasta terminar el empadre.

### MANEJO DE LAS OVEJAS DURANTE EL EMPADRE

Las canchas de pastoreo en la época de empadre deben tener pastos de primera calidad, en terrenos planos con corriente de agua; debe pastorearse desde las 6 am. hasta las 6 pm para cubrir las necesidades nutricionales.

El pastor debe mover a los animales a las 12 m para que los machos puedan encontrar hembras en celo.



### MANEJO DE LOS MACHOS LUEGO DEL EMPADRE

En los días de descanso los machos deben recibir golpes vitamínicos para recuperar su vitalidad.

### CLASIFICACIÓN DE LOS VIENTRES PARA EL EMPADRE

- Borreguillas: Hembras al primer servicio, necesitan mayor cuidado, debe usarse machos adultos.

- Borregas u ovejas: En animales que tienen más de un parto, debe usarse los machos jóvenes y completar con adultos.
- La edad en majada debe ser máximo 6 - 7 años, en plantel 7 - 8 años. Es conveniente descartar las hembras que durante dos temporadas de empadre no fecundaron (machorras) y aquellas que tienen problemas físicos.



### SELECCIÓN DE MACHOS PARA EL EMPADRE

- Selección por procedencia

Es realizada en base a ascendencia o registro genealógico.

- Selección por fertilidad

Descartando carneros que macro y microscópicamente fueron diagnosticados infértiles por los casos siguientes: Fiebre, orquitis, epididimitis, hipoplasia testicular, criptorquidismo, testículos calcificados o fibrosos, fimosis.



Estación Experimental Agraria Santa Ana - Huancayo

Fundo Santa Ana Hualahoyo km 8,0 El Tambo - Huancayo   Teléfax: 064-246206   Teléfono: 064 - 247011

E-mail: [santaana@inia.gob.pe](mailto:santaana@inia.gob.pe)   [santaana\\_uea@inia.gob.pe](mailto:santaana_uea@inia.gob.pe)   [citsantaana@inia.gob.pe](mailto:citsantaana@inia.gob.pe)

<http://www.inia.gob.pe>